核准日期：2006年07月25日
修改日期：2010年10月01日
2015年12月01日
2020年10月13日
2020年12月14日
2021年07月06日
2025年10月01日

佳苏仑

盐酸多沙普仑注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

【药品名称】

通用名称：盐酸多沙普仑注射液

商品名称：佳苏仑

英文名称：Doxapram Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan Duoshapulun Zhusheye


【成份】

主要成份：盐酸多沙普仑。

辅料：注射用水。

其化学名称为（±）-1-乙基-3，3-二苯基-4-（2-吗啉-4-基乙基）吡咯烷-2-酮盐酸盐一水合物。

其化学结构式为：



分子式：$C_{24}H_{30}N_2O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$

分子量：432.99

【性状】

本品为无色澄明液体。

【适应症】

用于呼吸衰竭。

【规格】

5ml：0.1g

【用法用量】

静脉注射 按体重一次0.5~1.0mg/kg，不超过1.5mg/kg，如需重复给药，至少间隔5分钟。每小时用量不宜超过0.3g（3支）。静脉滴注 按体重一次0.5~1.0mg/kg临用前加葡萄糖氯化钠注射液稀释后静脉滴注，直至获得疗效，总量不超过一日3g（30支）。

【不良反应】

头痛、无力、恶心、呕吐、出汗、感觉奇热、腹泻及尿潴留。

【禁忌】

惊厥、癫痫、重度高血压、嗜铬细胞瘤、甲状腺功能亢进、冠心病、颅高压、严重肺部疾患者。

【注意事项】

用药时常规测定血压和脉搏，以防止药物过量。静脉注射漏到血管外或静脉滴注时间太长，均能导致血栓静脉炎或局部皮肤刺激。剂量过大时，可引起心血管不良反应如血压升高、心率加快、甚至出现心律失常。静脉滴注速度不宜太快，否则可引起溶血。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

慎用。

【儿童用药】

12岁以下儿童慎用。

【老年用药】

未进行该项实验且无可参考文献

【药物相互作用】

1、本品能促进儿茶酚胺的释放增多，在全麻药如氟烷、异氟烷等停用10~20分钟后，才能使用。2、本品与咖啡因、哌酯甲酯、匹莫林、肾上腺素受体激动药等合用，可能出现紧张、激动、失眠甚至惊厥或心律失常。3、本品与单胺氧化酶抑制药丙卡巴肼以及升压药合用时，可使血压明显升高。

【药物过量】

中毒症状：心动过速、心律失常、高血压、焦虑不安、震颤、谵妄、惊厥、反射亢进。处理：视病情给予相应的对症治疗和支持疗法。

【药理毒理】

本品为呼吸兴奋剂，小量时通过颈动脉体化学感受器反射性兴奋呼吸中枢，大量时直接兴奋延髓呼吸中枢，使潮气量加大，呼吸频率增快有限。大剂量兴奋脊髓及脑干，但对大脑皮层似无影响，在阻塞性肺疾病患者发生急性通气不全时，应用此药后，潮气量、血二氧化碳分压、氧饱和度均有改善。

【药代动力学】

静脉注射起效只需20~40秒，1~2分钟效应最显著，持续时间仅5~12分钟。静脉注射后迅速代谢，代谢产物经肾排泄。半衰期（$t_{1/2}$）为3小时。

【贮藏】

遮光，密闭保存。

【包装】

安瓿，5支/盒。

【有效期】

36个月

【执行标准】

《中国药典》2025年版二部。

【批准文号】

国药准字H32022989

【上市许可持有人】

药品上市许可持有人：江苏恩华药业股份有限公司

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路18号

【生产企业】

企业名称：江苏恩华药业股份有限公司

生产地址：徐州高新技术产业开发区

邮政编码：221000

电话号码：4009002262

传真号码：0516-87767118

网　　址：www.nhwa-group.com